

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме: вибіркових санітарних рубок в об'єктах природно-заповідного
фонду

ДП «Кременецький лісгосп»

14 жовтня 2022 року

м. Кременець

Нами, заступником директора ДСЛП „Львівлісозахист” Сеником В.М. та інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Макара М.Я., за участю заступника директора ДП «Кременецьке лісове господарство» Гуменюка І.Р. та провідного інженера лісового господарства Луцика В.М., в присутності відповідальних осіб лісництва, проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень ДП „Кременецьке ЛП” на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом по ходових лініях, з уточненням границь шляхом проходження по периметру, з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах, встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”.

Таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2014 року.

Мшанецьке лісництво:

Загальнозоологічний заказник місцевого значення «Мільно-Бліхівський»

- квартал 28 виділ 5, площа 3,6 га.

Спостерігається поодинокі та групове ослаблення та всихання дерев ялини європейської (на стовбурах вітровальних дерев є отвори та бурова мука, а під корою наявні ходи стовбурових шкідників (короїда шести зубого, лубоїдів, вусачів та інших) та ураження грибами офіостомової групи. Крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній, всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, кора частково відпала від стовбура. Ялина практично випала із складу насадження, пройшла зміна порід на таксаційному виділі.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії; інтенсивність вибірки—середня.

- квартал 28 виділ 3, площа 0,9 га. Значна частина дерев ялини європейської вітровальна та з пошкодженими кронами. Спостерігається поодинокі та групове ослаблення та всихання дерев ялини (на стовбурах вітровальних дерев є отвори та бурова мука а під корою наявні ходи стовбурових шкідників (короїда шести зубого і верхівкового, лубоїдів, вусачів та інших) та ураження грибами офіостомової групи. Крона дуже



ажурна, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній, всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, кора частково відпала від стовбура. Ялина практично випала із складу насадження, пройшла зміна порід на таксаційному виділі.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії; інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 28 виділ 1 площа 20,0 га.

Частина крон дерев дуба звичайного дуже ажурна, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони. Також частина крон зламана та розколені стовбури навпіл. На окремих стовбурах дуба кора частково відстала, де спостерігається сліди заселення стовбурових та технічних шкідників (з наявною буровою мукою). Граб звичайний знаходиться в пригніченому стані: суховершинний, злам крон, водяні пагони, дуплистість, механічні пошкодження. На окремих деревах дуба та граба виявлені ризоморфи опенька осіннього.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев III -VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 29 виділ 13 площа 2,4 га.

Спостерігається поодинокі ослаблення та всихання дерев ялини європейської та ураження грибами офіостомової групи. Крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній, всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, кора частково відпала від стовбура, про що свідчать наявні отвори та ходи стовбурових та технічних шкідників (короїдів та вусачів).

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії; інтенсивність вибірки – слабка.

- квартал 29 виділ 5, площа 0,7 га.

Значна частина дерев ялини європейської вітровальна та з пошкодженими кронами. Спостерігається поодинокі та групове ослаблення та всихання дерев ялини (на стовбурах вітровальних дерев є отвори та бурова мука, а під корою наявні ходи стовбурових шкідників (короїда шести зубого і верхівкового, лубоїдів, вусачів та інших), ураження грибами офіостомової групи. Крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній, всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, кора частково відпала від стовбура. Ялина практично випала із складу насадження, пройшла зміна порід на таксаційному виділі.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії; інтенсивність вибірки – середня.

Тернопільське лісництво:

Батанічний заказник місцевого значення «Шляхтинецький»

- квартал 19 виділ 1 площа 11,0 га.

На корі ясена звичайного виявлено значну кількість отворів короїда західного непарного, а під корою наявні його маточні та личинкові ходи. В нижній частині стовбурів виявлено ходи комах руйнуючих деревину (вусачів та златок), подекуди наявні розкльови кори дерев птахами. В даному



виділі спостерігаються процеси деградації та розладнання деревостану та втрати біологічної стійкості.

Також наявна значна кількість дерев ясена з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, внаслідок ураження грибковим збудником (*Chalarafraxinea*).

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 19 виділ 2 площа 1,0 га.

В процесі обстеження дерев ясена звичайного наявні характерні ознаки популяційних показників стовбурових шкідників. Практично всі стовбури вітровальних дерев зайняті ходами дереворуйнівних комах (короїдом західним непарним, лубоїдом ясеневим великим та заболонниками). Значна частина дерев ясена з підірваною кореневою системою та нахилом нижньої і середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі вітровальна. Дерев ясена звичайного ураженні грибковим збудником (*Chalarafraxinea*).

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії; інтенсивність вибірки — середня.

Збаразьке лісництво:

Загальнозоологічний заказник місцевого значення «Малоберезовицько-Іванчанський»

- квартал 6 виділ 1 площа 1,6 га.

Спостерігається поодинокі та групове ослаблення та всихання дерев ялини європейської (на окремих вітровальних дерев є отвори та бурова мука, а під корою наявні ходи стовбурових шкідників (короїда шести зубого, лубоїдів, вусачів та інших), ураження грибами офіостомової групи. Крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній, всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, кора частково відпала від стовбура. Ялина практично випала із складу насадження, пройшла зміна порід на таксаційному виділі. Черешня уражена стовбуровими гнилями із зламом крони та розколом стовбура навпіл.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 4 виділ 28 площа 2,7 га.

Значна частина дерев ялини європейської вітровальна та суховершинна. Спостерігається групове ослаблення та всихання дерев ялини (на стовбурах вітровальних дерев є отвори та бурова мука, а під корою наявні ходи стовбурових шкідників (короїда шести зубого і верхівкового, лубоїдів, вусачів та інших) та ураження грибами офіостомової групи. Крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній, всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, кора частково відпала від стовбура. Ялина практично випала із складу насадження, пройшла зміна порід на таксаційному виділі.



Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії; інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 7 виділ 4 площа 2,5 га.

Значна частина дерев ялини європейської вітровальна та суховершинна. Спостерігається поодинокі та групове ослаблення та всихання дерев ялини (на стовбурах вітровальних дерев є отвори та бурова мука, а під корою наявні ходи стовбурових шкідників (короїда шестизубого і верхівкового, лубоїдів, вусачів та інших), ураження грибами офіостомової групи. Крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтуватозелена, приріст відсутній, всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, кора частково відпала від стовбура. На деревах ялини, подекуди, наявні розкльови кори та стовбура дерев птахами. Ялина практично випала із складу насадження, пройшла зміна порід на таксаційному виділі.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорії; інтенсивність вибірки – середня.

Скалатське лісництво:

Загальнозоологічний заказник місцевого значення «Подільсько-Сороцький»

- квартал 49 виділ 1 площа 3,1 га.

Частина дерев ясена звичайного вітровальна та підірваною кореневою системою та нахилом нижньої і середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. В процесі обстеження дерев ясена, наявні характерні ознаки популяційних показників стовбурових шкідників. Практично всі стовбури вітровальних дерев зайняті ходами дереворуйнівних комах (короїдом західним непарним, лубоїдом ясеневим великим та заболонниками). Також наявний некроз ясена (відмирання скелетних коренів, ослаблення крони, мертві гілки більше 80%).

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 48 виділ 2 площа 13,0 га.


У виділі наявні процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням та сильним ослабленням ясена звичайного, береста та інших порід. Причинами ослаблення і всихання оглянутих дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками (лубоїди, заболонники, короїд західний непарний та інші).

Крони ослаблених дерев ясена та береста дуже ажурні, приріст відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони. Також наявна значна кількість дерев ясена вітровальна та з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

- квартал 48 виділ 6 площа 12,5 га.

Частина дерев ясена звичайного вітровальна та з наявними ознаками



ураження халаровим некрозом. На корі ясена виявлено значну кількість отворів короїда західного непарного, а під корою наявні його маточні та личинкові ходи. В нижній частині стовбурів виявлено ходи комах руйнуючих деревину (вусачів та златок), подекуди наявні розкльови кори дерев птахами.

Відведення у ВСР провести за рахунок дерев IV -VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.

Висновки та пропозиції:

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 13 лісових ділянок на загальній площі 75,0 га, при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 47,6 га

- середня ступінь пошкодження 47,6 га.

Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби – 14,4 га

- слабка ступінь пошкодження 2,4 га;
- середня ступінь пошкодження 9,3га;
- сильна ступінь пошкодження 2,7 га.

Пошкодження судинним мікозом – 13,0 га

- середня ступінь пошкодження 13,0 га.

2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркового санітарного рубок в межах 13 обстежених ділянок на загальній площі 75,0 га.

3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал на 1аркуші.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 9 аркушах.
3. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 7 аркушах.
4. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 8 аркушах.

Заступник директора
ДСЛП „Львівлісозахист”
Інженер-лісопатолог Тернопільського
опорного лісопатологічного пункту
ДСЛП „Львівлісозахист”

Заступник директора
ДП «Кременецьке лісове господарство»
Провідний інженер лісового господарства
ДП «Кременецьке лісове господарство»

Василь СЕНИК

Марія МАКАРА

Ігор ГУМЕНЮК

Василь ДІДИК

